



## Rasbeschrijving

## Peer (*Pyrus communis* L.)

Naam	Kleipeer
Synoniemen	Winterjan
Herkomst	Onbekend, waarschijnlijk Nederland, meer dan 200 jaar oud. Is verdrongen door de beter smakende en grotere Gieser Wildeman.
<b>VRUCHT</b>	
Vorm	De grootste diameter ligt in het midden.
Formaat	Lengte en breedte beide 55 mm. Het profiel is holrond, vaak licht asymmetrisch.
Kleur	Eerst groengeel, later geelgroen, met bruine lenticellen en roest die zich vanaf kelk en steel verder uitspreidt.
Steel en Steelholte	Steel 19 mm lang en 3 mm dik, meestal onder een lichte hoek staand. Steelholte bijna vlak.
Kelk en kelkholte	Open, vlak en smal. Kelkholte ondiep, 3 mm, kelkblaadjes opstaand. Resten van meeldraden.
Vruchtvlees	Wit, hard, korrelig.
Pluktijd	Oktober.
Consumptietijd	December tot half maart.
Gewicht	80 g.
<b>BOOM</b>	
Boom	Sterk opgaand, gedrongen groei.
Blad	Bladbasis en punt rechthoekig, rand scherp gezaagd. Steel 32 mm lang.
Bloei	April, zelfbestuivend.
Vruchtbaarheid	Zeer groot, draagt vroeg. Vanwege beurtjaren is vruchtdunning aan te raden.
Teelt	Veredeling voor hoogstam op zaailing, voor struikvorm op kwee.
Gebruik	Stoofpeer, roodkokend, vraagt weinig suiker.
Ziekten/Beschadigingen	Vatbaar voor aantasting door wantsen en pereringworm bij minder goede verzorging.
Accessienummer	9246TL04

### Afbeeldingen

Naam

Kleipeer

